

Вашето име:

---

---

Име на лекаря (предписал Jyseleca):

---

---

Телефонен номер на лекаря:

---

---

Дата на започване на Jyseleca:

---

---

Винаги носете тази карта със себе си, докато приемате Jyseleca, и я показвайте на всяко медицинско лице, участващо във Вашите грижи или лечение, напр. фармацевт или спешен лекар.

#### Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в листовката на този лекарствен продукт нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

#### Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8 1303, гр. София,  
Р. България  
тел.: +359 2 8903 417  
факс: +359 2 8903 434  
e-mail: [bda@bda.bg](mailto:bda@bda.bg)



[www.bda.bg](http://www.bda.bg) / Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Посетете нашия уебсайт  
<https://www.jyseleca.eu/>

Дата на одобрение: юли 2023  
NP-28329

# Сигнална карта за пациента

Винаги носете със себе си  
тази карта

Информация за пациентите относно  
безопасността на Jyseleca® 100; 200 mg  
филмирани таблетки Filgotinib  
(филготиниб).

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили.



Тази карта съдържа важна информация за пациентите относно безопасността на Jyseleca. Моля, прочетете листовката с информация за пациента за повече информация.



## Инфекции

- Jyseleca може да доведе до влошаване на съществуваща инфекция или повишаване на вероятността от получаване на нова инфекция. Говорете с Вашия лекар незабавно, ако се разболеете или забележите някакви признаци на инфекция, като:
  - Треска или втрисане, недостиг на въздух, кашлица, чувство на по-голяма умора от обичайното – това може да са признаци на пневмония
  - Треска, изпотяване, загуба на тегло или кашлица, която не отзвучава – това може да са признаци на туберкулоза (ТБ)
  - Болезнен кожен обрив с мехури – това може да е признак на херпес (херпес зостер)
- Преди започване на Jyseleca, попитайте Вашия лекар дали трябва да се изследвате за ТБ, включително неактивна инфекция
- Кажете на Вашия лекар, ако наскоро сте били в близък контакт с лице с ТБ

## Злокачествени заболявания и рак на кожата

Jyseleca може да доведе до повишен риск от злокачествени заболявания. Уведомете Вашия лекар, ако откриете новообразувание по кожата си.

## Кръвни съсиреци във вените на краката или белите дробове

- Кажете на Вашия лекар незабавно, ако получите симптоми на кръвни съсиреци в краката или белите дробове, като болезнен подут крак, болка в гърдите или недостиг на въздух

## Холестерол

Високият холестерол е важен рисков фактор за сърдечно заболяване. Докато приемате Jyseleca, Вашият лекар ще проверява нивата на холестерола. Това ще помогне за решаване дали се нуждаете от лечение за понижаване на нивата на холестерола.

## Ваксини

- Не трябва да Ви бъдат прилагани определени (живи) ваксини (напр. Zostavax™, използвана за предотвратяване на херпес зостер), докато приемате Jyseleca
- Говорете с Вашия лекар или фармацевт за ваксините преди започване на Jyseleca. Възможно е те да искат да се уверят, че са Ви приложени всички необходими ваксини

## Бременност, контрацепция и кърмене

Jyseleca не трябва да се използва по време на бременност

- Трябва да използвате ефективна контрацепция, докато приемате Jyseleca и поне 1 седмица след приема на последната доза
- Ако забременеете, докато приемате Jyseleca, или мислите, че може да сте бременна, спрете приема на Jyseleca и незабавно говорете с Вашия лекар
- Ако планирате бременност, говорете с Вашия лекар преди това

Не трябва да кърмите, докато приемате Jyseleca

## Сърдечни заболявания

Jyseleca може да доведе до повишен риск от определени сърдечни заболявания. Уведомете Вашия лекар, ако почувствате дискомфорт в гърдите (който може да се разпространява към ръцете, челюстта, врата и гърба), задух или замайване.