

Teie nimi:

Arsti nimi

(Jyseleca ravi määranud arst):

Arsti telefoni number:

Jyseleca raviga alustamise kuupäev:

Kandke seda kaarti alati endaga kaasas, kui te võtate Jyseleca't ja näidake seda igale tervishoiutöötajale, kes osaleb teie ravis, näiteks apteekrile või erakorralise meditsiini osakonna arstile.

▼ Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutus-teavet. Te saate sellele kaasa aidata teatades igast kõrvaltoimest, mis teil esineb. Kõrvaltoimetest teatades, annate te olulist teavet selle ravimi ohutuse kohta. Kõrvaltoimetest teatamise kohta lugege pakendi infolehest.

Külastage meie veebilehte



NP-27802 versioon 1.0

PATSIENDI HOIATUSKAART

Kandke seda kaarti alati
endaga kaasas.

Jyseleca®▼ (filgotiniib) ohutusalane
teave patsientidele.



See kaart sisaldab patsientidele
olulist teavet Jyseleca ohutuse kohta.
Palun lugege täiendavat teavet
patsiendi infolehest.



Infektsioonid

Jyseleca võib raskendada olemasolevat infektsiooni või suurendada võimalust uue infektsiooni tekkeks. Rääkige oma arstile kohe, kui haigestute või märkate infektsiooni märke, nagu:

- Palavik või külmavärinad, hingamisraskused, köha, tunnete end rohkem väsinuna kui tavaliselt - need võivad olla kopsupõletiku tunnused.
- Palavik, higistamine, kehakaalu langus ja püsiv köha - need võivad olla tuberkuloosi (TB) tunnused
- Valulik villiline nahalööve. See võib olla vöötohatise tunnus (*herpes zoster*).

Enne Jyseleca raviga alustamist küsige oma arstilt, kas teid peaks kontrollima TB suhtes, sealhulgas mitteaktiivse infektsiooni suhtes.

Rääkige oma arstile, kui te olete hiljuti olnud lähikontaktis inimesega, kellel on TB.

Vähk ja nahavähk

Jyseleca võib põhjustada vähi tekkeriski tõusu. Rääkige oma arstile, kui avastate oma nahal uusi moodustisi.

Trombid jalaveenides ja kopsudes

Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekivad jalaveenides või kopsudes esineva trombi tunnused, nagu valulik paistes jalg, valu rinnus või õhupuudus.

Kolesterool

Kõrge kolesterool on südamehaiguse oluline riskifaktor. Kui te võtate Jyseleca't, kontrollib teie arst kolesteroolinäitajaid. See aitab otsustada, kas te vajate ravi kolesteroolisisalduse langetamiseks.

Vaktsiinid

- Teile ei tohi Jyseleca võtmise ajal manustada teatud (elus) vaktsiine (näiteks Zostavax'i, mida kasutatakse vöötohatise profülaktikaks).
- Rääkige oma arsti või apteekriga vaktsiinidest enne, kui te alustate Jyseleca võtmist. Arst soovib tõenäoliselt veenduda, kas teile on eelnevalt tehtud vajalikud vaksineerimised.

Rasedus, raseduse vältimine ja rinnaga toitmine

Jyseleca't ei tohi raseduse ajal kasutada:

- Kasutage Jyseleca võtmise ajal ja vähemalt 1 nädal pärast viimase annuse võtmist efektiivset rasestumisvastast vahendit
- Kui te rasestute Jyseleca kasutamise ajal, või arvate et võite olla rase, lõpetage Jyseleca võtmine ja rääkige kohe oma arstiga
- Kui te plaanite rasedust, siis rääkige sellest enne oma arstile

Jyseleca võtmise ajal ei tohi last rinnaga toita.

Südamehaigus

Jyseleca võib põhjustada teatud südamehaiguste riski suurenemist. Rääkige oma arstile, kui te tunnete ebamugavustunnet rinnus (mis võib kiirguda kättesse, lõuga, kaela ja selga), õhupuudust või pearinglust.