

Ulotka dołączona do opakowania

Polska

ALFASIGMA 



Jyseleca[®] ▼
filgotinib

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Jyseleca 100 mg tabletki powlekane
Jyseleca 200 mg tabletki powlekane
filgotynib

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Jyseleca i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Jyseleca
3. Jak przyjmować lek Jyseleca
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Jyseleca
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Jyseleca i w jakim celu się go stosuje

Lek Jyseleca zawiera substancję czynną filgotynib. Lek Jyseleca należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinaz janusowych, które pomagają w zmniejszaniu stanu zapalnego.

Reumatoidalne zapalenie stawów

Lek Jyseleca jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą zapalną stawów. Można go stosować, jeśli wcześniejsze terapie nie były wystarczająco skuteczne lub nie były tolerowane. Lek Jyseleca można stosować samodzielnie lub razem z innym lekiem przeciwreumatoidalnym, metotreksatem.

Lek Jyseleca zmniejsza stan zapalny w organizmie pacjenta. Pomaga on zmniejszać ból, sztywność i obrzęk stawów oraz zmęczenie, a także spowalniać proces uszkodzania kości i chrząstki w stawach. To działanie może ułatwić pacjentom wykonywanie codziennych czynności, a przez to poprawić ich jakość życia.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Lek Jyseleca jest stosowany w leczeniu osób dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą zapalną jelit. Można go stosować, jeśli pacjent nie reaguje odpowiednio lub nie toleruje wcześniejszej terapii. Pomaga zmniejszyć objawy przedmiotowe i podmiotowe wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz ograniczyć konieczność przyjmowania leków sterydowych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Jyseleca

Kiedy nie przyjmować leku Jyseleca:

- **jeśli pacjent ma uczulenie** na filgotynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- **jeśli u pacjenta występuje aktywna gruźlica (TB);**
- **jeśli u pacjenta występuje aktywne ciężkie zakażenie** (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);
- **jeśli pacjentka jest w ciąży** lub przypuszcza, że może być w ciąży.

➔ Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, **nie wolno mu przyjmować leku Jyseleca i musi natychmiast powiadomić o tym lekarza.**

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Jyseleca **należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą**, jeśli:

- **u pacjenta występuje zakażenie** lub pacjent ma nawracające zakażenia. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta pojawiają się takie objawy jak gorączka, rany, uczucie zwiększonego zmęczenia niż zazwyczaj lub problemy stomatologiczne, ponieważ mogą być one objawami zakażenia. Lek Jyseleca może zmniejszyć zdolność organizmu do zwalczania zakażeń oraz może on pogorszyć już istniejące zakażenie lub zwiększyć prawdopodobieństwo rozwinięcia się nowego zakażenia. Jeśli u pacjenta występuje cukrzyca lub jest w wieku 65 lat lub starszy, może u niego występować większe ryzyko zakażenia.
- **pacjent kiedykolwiek chorował na gruźlicę (TB)** lub miał kontakt z osobą chorą na gruźlicę. Przed podaniem leku Jyseleca i w trakcie leczenia może być konieczne wykonanie badań w kierunku gruźlicy.
- **pacjent chorował na półpasiec (*Herpes Zoster*)**, ponieważ lek Jyseleca może przyczynić się do nawrotu choroby. Należy poinformować lekarza w przypadku pojawienia się bolesnej wysypki skórnej z pęcherzami w trakcie leczenia lekiem Jyseleca, ponieważ mogą to być objawy półpaśca.
- **pacjent kiedykolwiek chorował na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C.**
- **u pacjenta występuje lub występował rak lub jeśli pacjent obecnie lub w przeszłości palił papierosy**, lekarz omówi z pacjentem, czy lek Jyseleca jest dla niego odpowiedni.
- **raka skóry niebędącego czerniakiem obserwowano u pacjentów przyjmujących lek Jyseleca.** Lekarz może zalecić wykonywanie regularnego badania skóry podczas przyjmowania leku Jyseleca. Jeśli pojawi się nowa zmiana skórna w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu lub istniejące zmiany zmieniają wygląd, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
- **pacjent został ostatnio zaszczepiony** lub planuje szczepienie. Nie zaleca się niektórych typów szczepionek (żywych szczepionek) podczas stosowania leku Jyseleca. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Jyseleca należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Mogą chcieć upewnić się, że pacjent ma wykonane aktualne szczepienia.
- **u pacjenta występują lub występowały choroby serca**, lekarz omówi z pacjentem, czy lek Jyseleca jest dla niego odpowiedni.
- **u pacjenta wcześniej występowały zakrzepy** w żyłach nóg (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna) lub pacjent jest w grupie zwiększonego ryzyka ich wystąpienia (np. jeśli pacjent niedawno przeszedł poważny zabieg operacyjny, przyjmuje antykoncepcję hormonalną/hormonalną terapię zastępczą, jeśli u pacjenta lub u jego bliskich krewnych kiedykolwiek stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi). Lekarz omówi z pacjentem, czy lek Jyseleca jest dla niego odpowiedni. Należy poinformować lekarza w przypadku pojawienia się nagłej duszności lub trudności w oddychaniu, bólu w klatce piersiowej lub bólu w górnej części pleców, obrzęku nogi lub ramienia, bólu w nodze lub tklivości lub zaczerwienienia lub odbarwienia nogi lub ręki, ponieważ mogą to być objawy zakrzepów żylnych.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi mogą być bardziej narażeni na ryzyko zakażeń, zawału serca oraz niektórych rodzajów raka. Lekarz może podjąć decyzję, że lek Jyseleca nie jest odpowiedni dla pacjenta.

Dzieci i młodzież

Leku tego nie podawać dzieciom w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie badano jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Lek Jyseleca a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, zwłaszcza jeśli pacjent stosuje leki działające na układ odpornościowy (takie jak cyklosporyna lub takrolimus).

Należy także powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

- leki stosowane w leczeniu niewydolności serca, choroby wieńcowej lub wysokiego ciśnienia krwi (takie jak diltazem lub karwedilol);
- lek fenofibrat (stosowany w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu).

Ciąża, antykoncepcja i karmienie piersią

Ciąża

Leku Jyseleca nie stosować w okresie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie może przyjmować tego leku. Trzeba poradzić się lekarza.

Antykoncepcja

Pacjentka powinna zachować ostrożność, aby nie zająć w ciążę podczas stosowania leku Jyseleca.

Stosować skuteczną metodę antykoncepcji w okresie przyjmowania leku Jyseleca i przez co najmniej 1 tydzień po przyjęciu ostatniej dawki leku Jyseleca. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie przyjmowania leku Jyseleca, należy zaprzestać przyjmowania tabletek i natychmiast poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Podczas stosowania leku Jyseleca nie karmić piersią. Nie wiadomo czy substancja czynna przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Jyseleca może powodować zawroty głowy, w tym zawroty głowy pochodzenia przedsionkowego (ang. *vertigo*). Jeśli podczas stosowania leku Jyseleca pacjent odczuwa zawroty głowy, nie wolno mu prowadzić pojazdów oraz posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać maszyn.

Lek Jyseleca zawiera laktozę.

Każda tabletką powlekana 100 mg leku Jyseleca zawiera 76 mg laktozy, a każda tabletką powlekana 200 mg leku Jyseleca zawiera 152 mg laktozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Jyseleca

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletką 200 mg lub 100 mg raz na dobę.

Jeśli pacjent jest w wieku 65 lat lub starszy i choruje na reumatoidalne zapalenie stawów lub występują u niego choroby nerek, lekarz może zalecić jedną tabletkę 100 mg raz na dobę. Leku Jyseleca nie zaleca się stosować, jeśli pacjent ma ponad 75 lat i choruje na wrzodziejące zapalenie

jelita grubego. Należy porozmawiać z lekarzem, jeżeli pacjent ma ciężkie choroby wątroby, ponieważ lek Jyseleca nie jest zalecany u tych pacjentów.

Tabletkę należy połknąć, popijając wodą. Nie dzielić, rozgniatać ani żuć tabletki przed jej połknięciem, ponieważ może to zmienić ilość leku dostarczanego do organizmu. Lek Jyseleca można przyjmować z posiłkiem lub pomiędzy posiłkami. Nie połykać środka osuszającego.

Lek Jyseleca należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Pomoże to pamiętać o przyjmowaniu tabletek.

Lekarz może wstrzymać leczenie czasowo lub na stałe, jeśli wyniki badań krwi wykażą małą liczbę białych lub czerwonych krwinek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Jyseleca

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy o tym natychmiast powiedzieć lekarzowi.

Pominięcie przyjęcia leku Jyseleca

- Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, powinien ją przyjąć natychmiast jak tylko sobie o tym przypomni.
- Jeśli pacjent przez całą dobę (24 godziny) nie przypomni sobie o tym, aby przyjąć lek, powinien pominąć tę dawkę i przyjąć tylko pojedynczą dawkę o zwykłej porze.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Jyseleca

Jeśli pacjent przerwie przyjmowanie leku Jyseleca, należy o tym natychmiast powiadomić lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub uzyskać pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów ciężkiego zakażenia, takich jak:

- gorączka i objawy zakażenia dróg moczowych (częstsze oddawanie moczu niż zazwyczaj, ból lub dyskomfort podczas oddawania moczu lub ból pleców). Zakażenia dróg moczowych występują często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób) i czasami mogą mieć ciężki przebieg.
- zakażenie płuc (zapalenie płuc): objawy mogą obejmować utrzymujący się kaszel, gorączkę, duszność oraz zmęczenie. To działanie występuje niezbyt często (może występować nie częściej niż u 1 na 100 osób).
- półpasiec (*Herpes Zoster*): objawy mogą obejmować bolesną wysypkę skórną z pęcherzami. To działanie występuje niezbyt często (może występować nie częściej niż u 1 na 100 osób).
- zakażenie krwi (posocznica): niezbyt często (może występować nie częściej niż u 1 na 100 osób).

Inne działania niepożądane

Należy skontaktować się z lekarzem w razie zauważenia któregośkolwiek z poniższych działań niepożądanych:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób)

- zakażenia gardła i nosa
- zawroty głowy
- nudności

Badania krwi mogą wykazać:

- mała liczba białych krwinek (limfocytów)
- zmniejszone stężenie fosforu we krwi

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób)

- uczucie wirowania w głowie (zawroty głowy)

Badania krwi mogą wykazać:

- mała liczba białych krwinek (neutrofili)
- zwiększenie aktywności enzymu z mięśni o nazwie fosfokinaza kreatyninowa
- zwiększenie stężenia tłuszczu we krwi (cholesterolu)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Jyseleca

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Nie używać, jeżeli folia zabezpieczająca na butelce została naruszona lub usunięta.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Jyseleca

- Substancją czynną leku jest filgotynib. Każda tabletkowa powlekana zawiera 100 mg lub 200 mg filgotynibu (jako maleinian filgotynibu).

- Pozostałe składniki leku to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia wstępnie żelatynizowana, krzemionka koloidalna, kwas fumarowy, magnezu stearynian
Otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Jyseleca i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Jyseleca 100 mg mają postać beżowych tabletek w rozmiarze 12 mm × 7 mm, w kształcie kapsułki z „G” na jednej stronie, a na drugiej stronie „100”.

Tabletki powlekane Jyseleca 200 mg mają postać beżowych tabletek w rozmiarze 17 mm × 8 mm, w kształcie kapsułki z „G” na jednej stronie, a na drugiej stronie „200”.

Lek Jyseleca 100 mg i 200 mg dostępny jest w butelkach zawierających 30 tabletek oraz pudełkach zawierających 3 butelki po 30 tabletek. W każdej butelce znajduje się osuszający żel krzemionkowy, który musi być przechowywany w butelce w celu ochrony tabletek. Osuszający żel krzemionkowy znajduje się w osobnej saszetce lub pojemniku i nie należy go połykać.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, n. 5
40133 Bologna
Włochy

Wytwórca

Alfasigma S.p.A.
Via Enrico Fermi, 1
65020 Alanno (PE)
Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2025

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków <https://www.ema.europa.eu>.

Kod QR do uzupełnienia

www.jyseleca.eu