

Vaše meno:

Meno lekára (ktorý predpísal liek Jyseleca):

Telefónne číslo lekára:

**Dátum začiatku liečby liekom
JYSELECA:**

Túto kartu majte počas užívania lieku Jyseleca vždy pri sebe a ukážte ju každému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vám poskytuje starostlivosť alebo liečbu, napríklad lekárníkovi alebo lekárovi pohotovostnej služby.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite podozrenia na akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré sa u vás vyskytnú. Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. Informácie o tom, ako hlásiť podozrenia na vedľajšie účinky, nájdete v Písomnej informácii pre používateľa.

NP-23721
Dátum schválenia: 11/2022

Pohotovostná karta pacienta

Túto kartu majte vždy pri sebe.

Informácie o bezpečnosti lieku JYSELECA® ▼
(filgotinib) pre pacientov.



Táto karta obsahuje dôležité informácie pre pacientov o bezpečnosti lieku Jyseleca. Pre ďalšie informácie si prečítajte Písomnú informáciu pre používateľa.



JYSELECA

Infekcie

- JYSELECA môže zhoršiť existujúcu infekciu alebo zvýšiť riziko nákazy novou infekciou. Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak ochoriete, alebo ak si všimnete príznaky infekcie, ako napríklad:
 - horúčka alebo zimnica, dýchavičnosť, kašeľ, pocit väčšej únavy ako obvykle – môžu to byť príznaky zápalu pľúc,
 - horúčka, potenie, úbytok hmotnosti alebo pretrvávajúci kašeľ – môžu to byť príznaky tuberkulózy (TBC),
 - bolestivá kožná vyrážka s pluzgiermi – môžu to byť príznaky pásového oparu (herpes zoster).
- Pred začiatkom liečby liekom Jyseleca sa opýtajte svojho lekára, či sa máte dať vyšetriť na TBC vrátane neaktívnej infekcie
- Povedzte svojmu lekárovi, ak ste boli nedávno v úzkom kontakte s osobou s TBC

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Swedish Orphan Biovitrum o.z., Mudroňova 51, 81103 Bratislava na e-mailovú adresu: mail.sk@sobi.com, tel.č.: +421 2 3211 1540.

Krvné zrazeniny v žilách dolných končatín alebo v pľúcach

- Ak sa u vás objavia príznaky krvných zrazenín v žilách dolných končatín alebo pľúcach, ako bolesť dolnej končatiny s opuchom, bolesť v hrudníku alebo dýchavičnosť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi

Cholesterol

Vysoký cholesterol je významný rizikový faktor ochorenia srdca. Počas užívania lieku Jyseleca vám váš lekár skontroluje hladinu cholesterolu. To mu pomôže rozhodnúť sa, či potrebujete liečbu na zníženie hladiny cholesterolu

Očkovania

- Počas užívania lieku Jyseleca vám nemajú byť podané určité (živé) vakcíny (napríklad Zostavax™ používaná na prevenciu pásového oparu)
- Predtým, ako začnete užívať liek Jyseleca, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom o očkovaníach. Môže byť potrebné potvrdiť, že máte všetky očkovania

Tehotenstvo, antikoncepcia a dojčenie

Jyseleca sa nesmie užívať počas tehotenstva:

- Počas užívania lieku Jyseleca a aspoň 1 týždeň po užití poslednej dávky lieku používajte spoľahlivú antikoncepciu
- Ak počas užívania lieku Jyseleca otehotníte, alebo si myslíte, že ste tehotná, okamžite prestaňte užívať liek Jyseleca a ihneď to povedzte svojmu lekárovi
- Ak plánujete otehotnieť, najskôr sa porozprávajte so svojim lekárom

Počas užívania lieku Jyseleca nedojčíte.

Účinok na mužskú plodnosť

Je možné, že liek Jyseleca môže znížiť počet spermii alebo ovplyvniť kvalitu spermii. Nie sú známe účinky na schopnosť splodiť dieťa a nie je známe, či by akékoľvek potenciálne účinky mohli byť dočasné alebo trvalé. Ak plánujete splodiť dieťa teraz alebo v budúcnosti, porozprávajte sa so svojim lekárom