

Ihr Name:

.....
.....

**Name des Arztes, der Jyseleca
(Filgotinib) verschrieben hat:**

.....
.....

Telefonnummer des Arztes:

.....
.....

Lesen Sie bitte auch die
Gebrauchsinformation. Diese
Information ist erhältlich auf folgender
Internetseite:

www.jyseleca.eu

RMA, Version 11/2020

Patientenpass

Bitte tragen Sie diesen
Patientenpass stets bei sich.

Zeigen Sie diesen Pass jedem
Arzt und anderen Fachkräften im
Gesundheitswesen, die an Ihrer
medizinischen Versorgung beteiligt
sind, z. B. andere Ärzte als der
Filgotinib verordnende Arzt oder
Mitarbeiter in der Notaufnahme.

Dieser Patientenpass enthält
wichtige Informationen zur
sicheren Anwendung von Jyseleca®
(Filgotinib). Bitte lesen Sie auch die
Gebrauchsinformation.

Infektionen

- Die Behandlung mit Filgotinib kann bestehende Infektionen verschlimmern oder die Wahrscheinlichkeit für eine neue Infektion erhöhen. Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie Anzeichen einer Infektion bemerken, wie z. B.:
 - Fieber, nächtliches Schwitzen, Schüttelfrost, Gewichtsverlust, anhaltender Husten, Kurzatmigkeit, verstärkte Müdigkeit, schmerzhafter Hautauschlag mit Bläschenbildung.

Impfstoffe

- Sie sollten während der Behandlung oder unmittelbar vor Behandlungsbeginn mit Filgotinib gewisse Impfstoffe, sogenannte Lebendimpfstoffe, (z. B. Zostavax® zur Vorbeugung von Gürtelrose) nicht erhalten.
- Sprechen Sie Ihren Arzt vor einer Impfung darauf an – er weiß, welche Impfstoffe vor oder während der Behandlung mit Filgotinib nicht gegeben werden dürfen.

Blutgerinnsel in den Beinvenen oder der Lunge

- Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie Symptome von Blutgerinnseln in Ihren Beinen oder in Ihrer Lunge wie schmerzhaftes Schwellen der Beine, Brustschmerzen oder Kurzatmigkeit bekommen.

Cholesterin

- Ein hoher Cholesterinspiegel ist ein bedeutsamer Risikofaktor für Herzerkrankungen. Während Ihrer Einnahme von Filgotinib wird Ihr Arzt Ihren Cholesterinspiegel überprüfen, um zu entscheiden, ob Sie eine Behandlung zur Senkung Ihres Cholesterinspiegels benötigen.

Schwangerschaft, Verhütung und Stillzeit

- Nehmen Sie Filgotinib nicht ein, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.
- Nutzen Sie während der Einnahme von Filgotinib sowie für mindestens eine Woche nach der letzten Anwendung eine zuverlässige Verhütungsmethode.
- Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie während der Behandlung schwanger werden.
- Während der Einnahme von Filgotinib dürfen Sie nicht stillen.

Auswirkungen auf die männliche Fortpflanzungsfähigkeit

- Es ist möglich, dass Filgotinib die Spermienzahl senkt oder die Spermienqualität beeinflusst. Die Auswirkungen auf die Zeugungsfähigkeit und ein Rückgang möglicher Auswirkungen nach Behandlungsende sind nicht bekannt.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie jetzt oder in der Zukunft ein Kind zeugen möchten.