

Votre nom :

.....
.....

**Nom du médecin qui a prescrit
Jyseleca (filgotinib) :**

.....
.....

Numéro de téléphone du médecin :

.....
.....

Veillez également lire la notice.
Ces informations sont disponibles sur le
site internet :

www.jyseleca.eu

RMA, version 11/2020

Carte d'alerte patient

Gardez cette carte avec
vous en permanence.

Montrez la carte à tout médecin et
autres professionnels de la santé
impliqués dans vos soins de santé,
par exemple des médecins autres
que le médecin prescrivant le
filgotinib ou un médecin urgentiste.

Cette carte contient des informations
importantes pour les patients
concernant l'utilisation sûre de
Jyseleca® (filgotinib). Veuillez lire la
notice d'information du patient pour
plus d'informations.

Infections

- Le traitement par le filgotinib peut aggraver une infection existante ou augmenter la probabilité de contracter une nouvelle infection. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez des signes d'infection tels que :
 - Fièvre, sueurs nocturnes, frissons, perte de poids, toux persistante, essoufflement, sensation inhabituelle de fatigue, une éruption cutanée douloureuse accompagnée de cloques

Vaccins

- Vous ne devriez pas recevoir certains vaccins (vaccins vivants, par exemple Zostavax® qui est utilisé pour la prévention du zona) pendant ou immédiatement avant le traitement par le filgotinib.
- Avant de commencer à prendre le filgotinib, discutez de vos vaccins avec votre médecin ou pharmacien. Ils voudront probablement s'assurer que vous êtes à jour de vos vaccinations.

Caillots sanguins dans les veines des jambes ou dans les poumons

- Informez votre médecin immédiatement si vous présentez des symptômes de caillots sanguins dans les veines des jambes ou dans les poumons, comme une jambe gonflée douloureuse, une douleur dans la poitrine ou un essoufflement.

Cholestérol

- Un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque important de maladie cardiaque. Pendant que vous prenez le filgotinib, votre médecin vérifiera votre taux de cholestérol. Cela aidera à décider si vous avez besoin d'un traitement pour abaisser votre taux de cholestérol.

Grossesse, contraception et allaitement

- Ne prenez pas de filgotinib si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte.
- Utilisez un moyen de contraception efficace pendant que vous prenez le filgotinib et pendant au moins 1 semaine après la dernière prise.
- Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant que vous prenez le filgotinib, parlez-en immédiatement à votre médecin.
- N'allaitiez pas pendant que vous prenez le filgotinib.

Effet sur la fertilité masculine

- Il est possible que le filgotinib puisse diminuer la quantité de spermatozoïdes ou affecter la qualité des spermatozoïdes. Les effets sur la capacité à concevoir un enfant, et la réversibilité de tous les effets potentiels ne sont pas connus.
- Consultez votre médecin si vous voulez concevoir un enfant maintenant, ou à l'avenir.