

Uw naam:

.....
.....

Naam van arts
(die JYSELECA® heeft voorgeschreven):

.....
.....

Telefoonnummer van arts:

.....
.....

De datum waarop u begon met JYSELECA®:

.....
.....

Draag deze kaart tijdens gebruik van JYSELECA® altijd bij u en laat deze kaart zien aan elke zorgverlener die betrokken is bij uw zorg of behandeling, zoals een apotheker of spoedarts.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u ervaart. Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. Raadpleeg de bijsluiter voor informatie over het melden van bijwerkingen.

Bezoek onze website



JYSELECA® (filgotinib)

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Patiënten- waarschuwingskaart

Draag deze kaart altijd bij u.

Deze kaart bevat belangrijke informatie voor patiënten over de veiligheid van JYSELECA®. Lees de bijsluiter voor meer informatie.



Infecties

- JYSELECA® kan een bestaande infectie verergeren of uw kans op een nieuwe infectie vergroten. Vertel het uw arts meteen als u ziek wordt of verschijnselen merkt van een infectie, zoals:
 - vaker plassen dan normaal, pijn of ongemak tijdens het plassen of rugpijn – dit kunnen tekenen zijn van een urineweginfectie
 - koorts of koude rillingen, kortademigheid, hoesten, vermoeider voelen dan normaal - dit kunnen tekenen zijn van een longontsteking
 - koorts, zweten, gewichtsverlies of een hoest die niet weggaat - dit kunnen tekenen zijn van tuberculose (tbc)
 - een pijnlijke huiduitslag met blaren - dit kan een teken zijn van gordelroos (herpes zoster)
- Vraag uw arts voordat u met JYSELECA® begint of u getest moet worden op tbc, waaronder inactieve infecties
- Vertel het uw arts als u onlangs in nauw contact bent geweest met een persoon met tbc

Bloedstolsels in de aderen van uw been of longen

- Vertel het uw arts meteen als u symptomen krijgt van bloedstolsels in uw benen of longen, zoals een pijnlijk gezwollen been, pijn op de borst of kortademigheid

Cholesterol

- Een hoog cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor hartaandoeningen. Terwijl u JYSELECA® inneemt, zal uw arts uw cholesterolgehalte controleren. Dit zal helpen beslissen of u een behandeling nodig heeft om uw cholesterolgehalte te verlagen

Vaccins

- U mag bepaalde (levende) vaccins niet krijgen (bijvoorbeeld het vaccin ter voorkoming van gordelroos) wanneer u JYSELECA® inneemt
- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u JYSELECA® inneemt. Mogelijk willen zij controleren of al uw vaccinaties in orde zijn

Zwangerschap, anticonceptie en borstvoeding



JYSELECA® mag niet tijdens de zwangerschap worden ingenomen

- Gebruik effectieve anticonceptiemiddelen terwijl u JYSELECA® inneemt en gedurende 1 week na inname van uw laatste dosis
- Als u zwanger wordt terwijl u JYSELECA® inneemt of denkt dat u mogelijk zwanger bent, stop dan met de inname van JYSELECA® en raadpleeg onmiddellijk uw arts
- Praat eerst met uw arts als u van plan bent om zwanger te worden

Geef geen borstvoeding terwijl u JYSELECA® inneemt

Kanker en Huidkanker

- JYSELECA® kan leiden tot een verhoogd risico op kanker. Vertel het uw arts als u nieuwe huidlaesies ontdekt.

Hartziekte

- JYSELECA® kan leiden tot een verhoogd risico op bepaalde hartziekten. Vertel het uw arts als u last krijgt van pijn op de borst (die zich kan uitbreiden naar armen, kaak, nek en rug), kortademigheid of duizeligheid.