Dit navn:

_____

_____

Lægens navn (som ordinerede Jyseleca):

_____

_____

Lægens telefonnummer:

_____

_____

Dato du påbegyndte Jyseleca:

_____

_____

Hav altid dette kort med dig, mens du tager Jyseleca, og vis kortet til alle sundhedspersoner, der er involveret i din pleje eller behandling, fx en apoteker eller vagt-/skadestuelæge.

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. Se indlægssedlen angående, hvordan du indberetter bivirkninger.

Besøg vores website:
www.jyseleca.eu

DK--JY-202411-00001
Jyseleca-PAC-v4.0-08-2024
Materiale godkendt af
DKMA 31.10.2024

Patientkort

Hav altid dette kort med dig

Sikkerhedsoplysninger om ▼JYSELECA®
(filgotinib) til patienter.

Jyseleca®
filgotinib

Dette kort indeholder vigtige oplysninger til patienter om Jyselecas sikkerhed. Venligst læs patientkortet for yderligere oplysninger.

ALFASIGMA

Infektioner

- Jyseleca kan gøre en eksisterende infektion værre eller øge risikoen for at få en ny infektion. Fortæl det straks til lægen, hvis du bliver syg eller får tegn på en infektion såsom:
  - Feber eller kulderystelser, åndenød, hoste, du er mere træt end sædvanligt - det kan være tegn på lungebetændelse.
  - Febersvedeture, vægttab eller hoste, der ikke vil stoppe - det kan være tegn på tuberkulose (TB).
  - Et smertefuldt hududslæt med blister - det kan være tegn på helvedesild (herpes zoster).
- Før du påbegynder Jyseleca, skal du spørge din læge, om du bør testes for TB, herunder inaktiv infektion.
- Fortæl det til lægen, hvis du for nylig har været i tæt kontakt med en person med TB.

Blodpropper i venerne i benet eller lungerne

- Fortæl det straks til lægen, hvis du får symptomer på blodpropper i dine ben eller lunger, såsom et smertefuldt, hævet ben, brystsmerter eller åndenød.

Kolesterol

Forhøjet kolesterol udgør en vigtig risikofaktor for hjertesygdom. Lægen vil kontrollere dit kolesterolniveau under behandlingen med Jyseleca for at vurdere, om du har behov for kolesterolsænkende behandling.

Vacciner

- Du bør ikke få visse (levende) vacciner (fx Zostavax™, der anvendes til at forebygge helvedesild), mens du tager Jyseleca.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet om vacciner, før du påbegynder Jyseleca. De vil muligvis sikre sig, at du er opdateret med hensyn til vaccinationer.

Graviditet, prævention og amning

Jyseleca må ikke tages under graviditet:

- Du skal anvende sikker prævention, mens du tager Jyseleca, og i mindst 1 uge efter du tager din sidste dosis.
- Hvis du bliver gravid, mens du tager Jyseleca, eller du mener, at du kan være gravid, skal du holde op med at tage Jyseleca og straks tale med din læge.
- Hvis du planlægger at blive gravid, skal du tale med din læge forinden.

Du må ikke amme, mens du tager Jyseleca.

Kræft og hudkræft

Jyseleca kan føre til en øget risiko for kræft. Fortæl det til lægen, hvis du opdager nogen form for ny vækst på din hud.

Hjertesygdom

Jyseleca kan føre til en øget risiko for visse hjertesygdome. Fortæl det til lægen, hvis du oplever ubehag i brystet (der kan sprede sig til arme, kæbe, hals og ryg), åndenød eller svimmelhed.