

Oma nimi:

**Jyseleca-valmistetta
määränneen lääkärin nimi:**

Lääkärin puhelinnumero:

**Jyseleca-hoidon
aloituspäivämäärä:**

Pidä tämä kortti aina mukana
Jyseleca-hoidon aikana ja näytä tämä
kortti kaikille hoitoosi osallistuville
terveydenhuollon ammattilaisille,
esimerkiksi apteekkihenkilökunnalle ja
ensihoitolääkärille.

▼ Tähän lääkevalmisteseen kohdistuu
lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan ha-
vaita nopeasti turvallisuutta koskevaa
uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla
kaikista mahdollisesti saamistasi
haittavaikutuksista. Ilmoittamalla hait-
tavaikutuksista voit auttaa saamaan
enemmän tietoa tämän lääkevalmis-
teen turvallisuudesta. Ks. pakkausse-
lostesta, miten haittavaikutuksista
ilmoitetaan.

**Tutustu
verkkosivuihimme**
www.jyseleca.eu

Jyseleca-PAC-v4-08-2024
Riskienhallintamateriaali
hyväksytty Fimeassa 21.10.2024
FI--JY-202411-00003



Potilaskortti

Pidä tämä kortti aina mukanas

▼JYSELECA®-valmisteen (filgotinibi)
turvallisuutta koskevaa tietoa potilaille.

Tämä kortti sisältää tärkeää tietoa
potilaille Jyseleca-valmisteen
turvallisuudesta. Lue lisätietoja
pakkausselosteesta.

Infektiot

- Jyseleca saattaa pahentaa olemassa olevaa infektiota tai suurentaa uuden infektion todennäköisyyttä. Kerro heti lääkärille, jos sairastut tai havaitset infektion merkkejä, kuten:
 - kuumetta tai vilunväristyksiä, hengenahdistusta, yskää, tavallista voimakkaampaa väsymystä – nämä voivat olla keuhkokuumeen oireita.
 - kuume, hikoilu, laihtuminen tai yskä, joka ei parane – nämä voivat olla tuberkuloosin oireita.
 - kivulias rakkulainen ihottuma – tämä saattaa olla vyöruusun oire.
- Ennen Jyseleca-hoidon aloittamista kysy lääkäriltä, onko sinut testattava tuberkuloosin varalta, myös piilevän infektion varalta.
- Kerro lääkärille, jos olet äskettäin ollut läheisessä kosketuksessa henkilön kanssa, jolla on tuberkuloosi.

Jalkojen laskimoiden tai keuhkojen veritulpat

- Kerro heti lääkärille, jos sinulla ilmenee jaloissa tai keuhkoissa veritulpan oireita, kuten jalkasi muuttuu kivuliaaksi ja turpoaa tai jos sinulla ilmenee rintakipua tai hengenahdistusta.

Kolesteroli

Korkea kolesteroli on merkittävä sydän-sairauden riskitekijä. Lääkäri seuraa kolesteroliarvojesi Jyseleca-hoidon aikana. Tämä auttaa päättämään, tarvitsetko hoitoa kolesteroliarvojen pienentämiseen.

Rokotteet

- Sinulle ei pidä antaa tiettyjä (eläviä) rokotteita (esimerkiksi vyöruusua ehkäisevää ZostavaxTM-rokotetta) Jyseleca-hoidon aikana.
- Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa rokotuksista ennen Jyseleca-hoidon aloittamista. He haluavat ehkä varmistaa, että rokotuksesi ovat ajan tasalla.

Raskaus, ehkäisy ja imetys

Jyseleca-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana:

- Käytä tehokasta ehkäisyä Jyseleca-hoidon aikana ja vähintään 1 viikon ajan viimeisen annoksen ottamisen jälkeen.
- Jos tulet raskaaksi Jyseleca-hoidon aikana tai epäilet olevasi raskaana, lopeta Jyseleca-valmisteen ottaminen ja keskustele heti lääkärin kanssa.
- Jos suunnittelet raskautta, keskustele lääkärin kanssa etukäteen.

Älä imetä Jyseleca-hoidon aikana.

Syöpä ja ihosyöpä

Jyseleca saattaa johtaa syövän suurentuneeseen riskiin. Kerro lääkärillesi mikäli huomaat mitään muutoksia ihollasi.

Sydänsairaudet

Jyseleca saattaa johtaa tiettyjen sydänsairauksien riskin kohoamiseen. Kerro lääkärillesi, mikäli koet rintakipua (joka saattaa säteillä käsiin, leukaan, niskaan ja selkään), hengenahdistusta tai huimausta.