

Az Ön neve:

A kezelőorvos neve (aki a JYSELECA®-t felírta):

A kezelőorvos telefonszáma:

A JYSELECA®-kezelés kezdő dátuma:

A kezelés tartama alatt mindig tartsa magánál ezt a kártyát, és mutassa meg a gondozásában vagy a kezelésében részt vevő minden egészségügyi személynek, például gyógyszerésznek vagy sürgősségi orvosnak.

Verziószám: 1.0
NP-38902

NNGYK jóváhagyás
dátuma: 2025.09.22

Betegkártya

Ezt a kártyát mindig tartsa magánál!

Biztonsági információk a JYSELECA®
(filgotinib) gyógyszeréről a betegek számára.



Ez a kártya fontos információkat tartalmaz a betegek számára a JYSELECA® biztonságosságáról. További információkért, kérjük, olvassa el a betegtájékoztatót.



Fertőzések

- A JYSELECA® súlyosbíthat egy fennálló fertőzést, vagy növelheti egy új fertőzés kialakulásának esélyét. Azonnal beszéljen kezelőorvosával, ha megbetegszik, vagy fertőzésre utaló tüneteket észlel, például:
 - Láz vagy hidegrázás, légszomj, köhögés, szokásosnál nagyobb fáradtság érzése – ezek tüdőgyulladás jelei lehetnek
 - Láz, verejtékezés, fogyás vagy nem múló köhögés – ezek a tuberkulózis (TBC) jelei lehetnek
 - Fájdalmas, hólyagos bőrkiütések – ez az övsömör (herpes zoster) jele lehet
- A készítmény használata előtt kérdezze meg kezelőorvosát, hogy az Ön esetében szükséges-e szűrővizsgálatot végezni egy esetleges TBC-fertőzés kimutatására, ideértve egy inaktív fertőzés lehetőségét is.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha nemrégiben szoros kapcsolatban állt egy TBC-ben szenvedő személlyel!

Rosszindulatú daganat és bőrrák

A JYSELECA® okozhatja egy rosszindulatú daganat, ill. a bőrrák kialakulásának megnövekedett kockázatát. Tájékoztassa kezelőorvosát, ha bőrén bármilyen új elváltozást (kinövés, dudor) észlel!

Vérrögök képződése a lábak mélyen fekvő vénáiban vagy a tüdőben

- Azonnal szóljon kezelőorvosának, ha mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia jelenlétére utaló tünetek jelentkeznek, például lába (lábszára) fájdalmasan megduzzad, mellkasi fájdalmat érez vagy légszomja van!

Koleszterin

A magas koleszterinszint a szívbetegségek fontos kockázati tényezője. Amíg Ön JYSELECA®-t szed, orvosa ellenőrizni fogja a koleszterinszintjét. Ez segít eldönteni azt, hogy szükség van-e koleszterinszint csökkentő kezelésre.

Védőoltások

- Nem szabad bizonyos (élő, legyengített kórokozókat tartalmazó) védőoltásokat kapnia (például Zostavax™-ot az övsömör megelőzésére) a kezelés közben.
- A készítmény alkalmazása előtt beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével a védőoltások szükségességét. Ők ellenőrzik, hogy Ön megkapta-e az összes szükséges védőoltást.

Terhesség, fogamzásgátlás és szoptatás

A JYSELECA®-t terhesség alatt tilos alkalmazni!

- Használjon hatékony fogamzásgátló módszert a készítmény alkalmazásának tartama alatt és az utolsó dózis bevétele után számított további 1 hétig.
- Ha a készítmény alkalmazásának tartama alatt teherbe esik, vagy úgy gondolja, hogy terhes lehet, hagyja abba a gyógyszer szedését, és haladéktalanul beszéljen kezelőorvosával.
- Ha terhességet tervez, előbb beszéljen kezelőorvosával.

A JYSELECA® szedése mellett tilos szoptatni!

Szívbetegség

A JYSELECA® bizonyos szívbetegségek megnövekedett kockázatát okozhatja. Tájékoztassa kezelőorvosát, ha mellkasi diszkomfort érzést (amely kisérgőzhat a karokba, állkapocsba, nyakba vagy a hátba), légszomjat vagy szédülést tapasztal.