



Cos'è JYSELECA e a cosa serve

JYSELECA contiene il principio attivo filgotinib. Appartiene a un gruppo di medicinali noti come inibitori delle Janus chinasi, che aiutano a ridurre l'infiammazione.

JYSELECA è usato per il trattamento di adulti con artrite reumatoide, una malattia infiammatoria delle articolazioni. Può essere usato se la terapia precedente non è stata abbastanza efficace o non è stata tollerata. JYSELECA può essere usato da solo o assieme a un altro medicinale per l'artrite, metotrexato.

JYSELECA riduce l'infiammazione nel corpo. Contribuisce a ridurre dolore, stanchezza, rigidità e gonfiore delle articolazioni, e riduce il danno alle ossa e alla cartilagine nelle articolazioni. Questi effetti possono aiutarla a svolgere le normali attività quotidiane e a migliorare la sua qualità di vita.

Cosa deve sapere prima di prendere JYSELECA

Non prenda JYSELECA

- se è allergico a filgotinib o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (vedere paragrafo "Contenuto della confezione e altre informazioni");
- se ha tubercolosi (TB) attiva;
- se ha un'infezione grave attiva (vedere paragrafo "Avvertenze e precauzioni").
- se è in gravidanza o sospetta una gravidanza.

Se una qualsiasi di queste condizioni la riguarda, non prenda JYSELECA e informi immediatamente il medico.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere JYSELECA:

- se ha un'infezione o se contrae spesso infezioni. Informi il medico se si sente male (soprattutto con febbre o brividi, respiro affannoso, tosse persistente o stanchezza) mentre assume JYSELECA. JYSELECA può ridurre la capacità del suo organismo di combattere le infezioni. Può peggiorare un'infezione esistente o aumentare la possibilità che lei contragga una nuova infezione. Se ha un'età pari o superiore a 75 anni, ha un maggiore rischio di contrarre un'infezione grave;
- se ha mai avuto la tubercolosi (TB) o se è entrato in contatto con una persona affetta da TB. Potrebbe dover effettuare dei test per la tubercolosi prima e durante il trattamento con JYSELECA;
- se in passato ha avuto un'infezione da herpes zoster (fuoco di S. Antonio), in quanto JYSELECA potrebbe causarne la ricomparsa. Informi il medico se compaiono eruzioni cutanee dolorose con vesciche durante il trattamento con JYSELECA in quanto possono essere un segno di herpes zoster;
- se ha mai avuto l'epatite B o C;
- se ha il cancro. La decisione se somministrarle o meno JYSELECA dipenderà dal medico;
- se è ad alto rischio di sviluppare un tumore della pelle, il medico potrebbe raccomandarle misure di prevenzione come esami della cute regolari durante l'assunzione di JYSELECA. Si rivolga al medico se sviluppa un nuovo segno o se nota qualsiasi cambiamento nell'aspetto di una zona della pelle. Alcuni pazienti trattati con JYSELECA hanno sviluppato cancro della cute;
- se è un uomo, JYSELECA può ridurre la sua fertilità (ridurre la sua capacità di concepimento) o causare infertilità (incapacità di concepire). Vedere anche il paragrafo "Fertilità maschile";
- se ha recentemente ricevuto un vaccino o ha in programma di riceverlo. Alcuni tipi di vaccini (i vaccini vivi) non sono raccomandati durante l'utilizzo di JYSELECA. Si rivolga al medico o al farmacista prima di iniziare a prendere JYSELECA. Il medico o il farmacista si assicureranno che lei abbia ricevuto tutte le vaccinazioni;
- se ha problemi al cuore, pressione sanguigna alta o colesterolo alto;
- se ha avuto coaguli di sangue nelle vene delle gambe (trombosi venosa profonda) o nei polmoni (embolia polmonare) in passato. Informi il medico se manifesta gambe gonfie e doloranti, dolore toracico o respiro affannoso poiché questi possono essere segni di coaguli di sangue nelle vene.

Bambini e adolescenti

Non dia questo medicinale a bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni perché non è stato studiato in questo gruppo di età.

Altri medicinali e JYSELECA

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, in particolare se utilizza medicinali che agiscono sul sistema immunitario (come azatioprina, ciclosporina e tacrolimus).

È inoltre molto importante che consulti il medico o il farmacista se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

- medicinali per il trattamento dell'insufficienza cardiaca, malattia coronarica o ipertensione (come diltiazem o carvedilol)
- il medicinale fenofibrato (usato per il trattamento del colesterolo alto)

Gravidanza, contraccezione, allattamento e fertilità maschile

- **Gravidanza**
 JYSELECA non deve essere usato durante la gravidanza. Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, non prenda questo medicinale. Chieda consiglio al medico.
- **Contraccezione**
 Non inizi una gravidanza durante il trattamento con JYSELECA. Deve utilizzare un metodo contraccettivo affidabile durante il trattamento con JYSELECA e per almeno 1 settimana dopo l'ultima dose di JYSELECA. Se rimane incinta durante il trattamento con JYSELECA, interrompa l'assunzione delle compresse e informi immediatamente il medico.
- **Allattamento**
 Non allatti durante l'assunzione di JYSELECA. Non è noto se il principio attivo passi nel latte materno umano.
- **Fertilità maschile**
 Se è un uomo e sta assumendo JYSELECA, questo medicinale può avere effetti sulla produzione di spermatozoi e ridurre la fertilità (ridurre la capacità di concepimento) o causare l'infertilità (incapacità di concepire). Non è noto se questi effetti siano temporanei o permanenti. Informi il medico se ha domande o dubbi al riguardo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

JYSELECA può causare capogiro. Se avverte capogiro quando prende JYSELECA, non guidi veicoli e non utilizzi utensili o macchinari.

JYSELECA contiene lattosio

Ogni compressa rivestita con film di JYSELECA da 100 mg contiene 76 mg di lattosio e ogni compressa rivestita con film di JYSELECA da 200 mg contiene 152 mg di lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Come prendere JYSELECA

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è una compressa da 200 mg una volta al giorno.

- Se ha un'età pari o superiore a 75 anni o se ha problemi ai reni, il medico può raccomandarle una dose di una compressa da 100 mg al giorno. Informi il medico se ha gravi problemi al fegato, poiché JYSELECA non è raccomandato per lei.
- Deglutisca la compressa con un bicchiere d'acqua. Non divida, frantumi o mastichi la compressa prima di deglutirla poiché questo può modificare la quantità di medicinale che assume. Può prendere JYSELECA con cibo o tra i pasti. Non ingerisca l'essiccante.
- Prenda JYSELECA ogni giorno alla stessa ora. Questo la aiuterà a ricordarsi di assumere le compresse.
- Il medico può interrompere temporaneamente o definitivamente il trattamento se le sue analisi del sangue mostrano un basso numero di globuli bianchi o rossi.

Se prende più JYSELECA di quanto deve

Se prende più compresse di quanto deve, informi immediatamente il medico.

Se dimentica di prendere JYSELECA

- Se dimentica di prendere una dose, la prenda non appena se ne ricorda.
- Se è trascorso un giorno intero (24 ore) senza che lei abbia assunto una dose, salti la dose dimenticata e prenda una dose singola al solito orario.
- Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con JYSELECA

Se interrompe il trattamento con JYSELECA, informi immediatamente il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati gravi

Si rivolga immediatamente al medico o chiedi assistenza medica se sviluppa segni di infezione grave, compresi:

- febbre e sintomi di infezione delle vie urinarie (minzione più frequente del solito, dolore o fastidio durante la minzione o dolore alla schiena). Le infezioni delle vie urinarie sono comuni (possono riguardare fino a 1 persona su 10) e in alcuni casi possono essere gravi;
- infezione dei polmoni (polmonite): i sintomi possono includere tosse persistente, febbre, respiro affannoso e stanchezza. Questo effetto non è comune (può interessare fino a 1 persona su 100);
- fuoco di S. Antonio (herpes zoster): i sintomi possono includere un'eruzione cutanea dolorosa con vesciche. Questo effetto non è comune (può interessare fino a 1 persona su 100).

Altri effetti indesiderati

Si rivolga al medico se nota uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati:

Comuni
 (possono riguardare fino a 1 persona su 10)

- infezioni di naso e gola
- capogiro
- nausea.

Non comuni
 (possono riguardare fino a 1 persona su 100)

Le analisi del sangue possono mostrare:

- un basso numero di globuli bianchi (neutrofilii)
- un aumento di un enzima dei muscoli chiamato creatinfosfochinasi
- un aumento del livello dei grassi nel sangue (colesterolo).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo sito, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione:

Agenzia Italiana del Farmaco

Sito web:

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Come conservare JYSELECA

- Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
- Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità. Tenere il flacone ben chiuso. Non usi questo medicinale se nota che il sigillo sull'apertura del flacone è rotto o assente.
- Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene JYSELECA

- Il principio attivo è filgotinib. Ogni compressa rivestita con film contiene 100 o 200 mg di filgotinib (come filgotinib maleato).
- Gli altri componenti sono:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido pregelatinizzato, biossido di silicio colloidale, acido fumarico, magnesio stearato

rivestimento con film: alcol polivinilico, biossido di titanio (E171), macrogol, talco, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172)

Descrizione dell'aspetto di JYSELECA e contenuto della confezione

Le compresse rivestite con film di JYSELECA da 100 mg sono di colore beige, di dimensioni 12 mm x 7 mm, a forma di capsula, con impresso "GSI" su un lato e "100" sull'altro lato.

Le compresse rivestite con film di JYSELECA da 200 mg sono di colore beige, di dimensioni 17 mm x 8 mm, a forma di capsula, con impresso "GSI" su un lato e "200" sull'altro lato.

Le compresse di JYSELECA da 100 mg e 200 mg sono disponibili in flaconi da 30 compresse e in confezioni da 3 flaconi, ognuno contenente 30 compresse. Ciascun flacone contiene un gel essiccante di silice, che deve rimanere nel flacone per proteggere le compresse. Il gel essiccante di silice è contenuto in una bustina o in un contenitore separato e non deve essere ingerito.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Gilead Sciences Ireland UC
 Carrigtohill
 County Cork, T45 DP77
 Irlanda

Produttore

Gilead Sciences Ireland UC
 IDA Business & Technology Park
 Carrigtohill
 County Cork
 Irlanda

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Italia
 Galapagos Biopharma Italy S.r.l.
 Tel: 00800 7878 1345

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 09/2021

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali, <https://www.ema.europa.eu>.

Risorse utili

Queste sono alcune risorse utili da scaricare e stampare



Scheda di allerta per il paziente



Informazioni per il paziente