

Il suo nome:

**Nome del medico che le ha
prescritto JYSELECA:**

Numero di telefono del medico:

**Data in cui ha iniziato la terapia
con JYSELECA:**

Tenga questa scheda sempre con sé durante il trattamento con JYSELECA e la mostri agli operatori sanitari che le prestano assistenza o cure mediche, ad esempio un farmacista o un medico del pronto soccorso.

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio aggiuntivo. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

**Visiti il nostro
sito web**



IT-JY-202408-002 V.4.0

Materiale educativo di minimizzazione del rischio per il paziente approvato da AIFA in data 09/01/2025

Scheda di allerta per il paziente

Tenga questa scheda sempre con sé

Informazioni di sicurezza per i pazienti
su JYSELECA®▼ (filgotinib).



Questa scheda contiene importanti informazioni per i pazienti riguardo alla sicurezza di JYSELECA. Per maggiori informazioni le chiediamo di leggere il Foglio illustrativo.

ALFASIGMA 

JYSELECA

Infezioni

- JYSELECA potrebbe peggiorare un'infezione pre-esistente o aumentare le probabilità che lei contragga una nuova infezione. Informi immediatamente il suo medico se non si sente bene o se nota segni di infezione, compresi:
 - Febbre o brividi, respiro affannoso, tosse, sensazione di maggiore stanchezza rispetto al solito, questi potrebbero essere segni di polmonite
 - Febbre, sudorazione, perdita di peso o tosse persistente, questi potrebbero essere segni di tubercolosi (TB)
 - Un'eruzione cutanea dolorosa con vescicole - potrebbe essere un segno di "fuoco di Sant'Antonio" (herpes zoster)
- Prima di iniziare la terapia con JYSELECA, chieda al suo medico se deve essere sottoposto a un test per la TB, inclusa l'infezione latente
- Informi il suo medico se recentemente è stato a stretto contatto con una persona affetta da TB

Coaguli di sangue nelle vene delle gambe o nei polmoni

- Informi immediatamente il medico se manifesta sintomi di coaguli di sangue nelle gambe o nei polmoni, come gambe gonfie e doloranti, dolore toracico o respiro affannoso

Colesterolo

- Il colesterolo elevato è un fattore di rischio importante per la cardiopatia. Mentre sta assumendo JYSELECA, il medico controllerà i suoi livelli di colesterolo, per stabilire se è necessario un trattamento per abbassarli.

Vaccini

- Durante l'assunzione di JYSELECA non dovrà ricevere alcuni vaccini (vivi) (per esempio Zostavax™, usato per prevenire l'herpes zoster)
- Parli con il suo medico o farmacista riguardo ai vaccini prima di iniziare la terapia con JYSELECA. Questi si assicurerà che lei abbia ricevuto tutte le vaccinazioni previste dalle linee guida locali

Gravidanza, contraccezione e allattamento

JYSELECA non deve essere usato durante la gravidanza

- Utilizzi un metodo contraccettivo efficace durante l'assunzione di JYSELECA e per 1 settimana dopo l'ultima dose assunta
- Se rimane incinta durante l'assunzione di JYSELECA o se pensa di essere incinta, interrompa l'assunzione di JYSELECA e informi immediatamente il suo medico
- Se sta pianificando una gravidanza, ne parli prima con il suo medico

Non allatti durante l'assunzione di JYSELECA

Cancro e cancro della pelle

Jyseleca può portare ad un aumentato rischio di cancro. Informi il suo medico se rileva qualsiasi neoformazione sulla pelle.

Malattia cardiaca

Jyseleca può portare ad un aumentato rischio di alcune malattie cardiache. Informi il suo medico se manifesta fastidio toracico (che può diffondersi alle braccia, mandibola, collo e schiena), respiro affannoso e capogiro.