

Jūsų vardas ir pavardė:

---

---

Gydytojo (paskyrusio Jyseleca) vardas ir pavardė:

---

---

Gydytojo telefono numeris:

---

---

Data, kada pradėjote vartoti Jyseleca:

---

---

Kol vartojate Jyseleca, šią kortelę visada turėkite su savimi ir parodykite bet kuriam sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiam specialistui, dalyvaujančiam Jūsų priežiūroje ar gydyme, pavyzdžiui, vaistininkui ar skubios pagalbos skyriaus gydytojui.

▼ **Vykdoma papildoma šio vaisto stebėseną. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. paciento lapelyje.**

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant pakuotės lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais būdais:

- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje <https://vapris.vvkt.lt/vvktweb/public/nrv>;
- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama <https://www.vvkt.lt>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt));
- nemokamu telefonu 8 800 73 568.



Apsilankykite mūsų svetainėje [www.jyseleca.eu](http://www.jyseleca.eu)

# PACIENTO ĮSPĖJAMOJI KORTELĖ

Šią kortelę visada turėkite su savimi

Pacientams skirta saugumo informacija apie Jyseleca®▼  
(filgotinibas).

Šioje kortelėje pateikiama svarbi informacija pacientams apie Jyseleca saugumą. Daugiau informacijos rasite paciento informaciniame lapelyje.

Patvirtinimo data: 2023 m. gruodžio mėn. NP-29850

 **Jyseleca**®▼  
filgotinib

 sobi

## Infekcijos

- Jyseleca gali pasunkinti esamą infekciją arba padidinti tikimybę susirgti nauja infekcija. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jei susirgote arba pastebėjote infekcijos požymių, tokių kaip:
  - karščiavimas ar šaltkrėtis, dusulys, kosulys, didesnis nuovargis nei įprastai – tai gali būti plaučių uždegimo požymiai;
  - karščiavimas, prakaitavimas, svorio kritimas arba nepraeinantis kosulys – tai gali būti tuberkuliozės (TB) požymiai;
  - skausmingas odos išbėrimas su pūslėmis – tai gali būti juostinės pūslelinės (*Herpes zoster*) požymis.
- Prieš pradėdami vartoti Jyseleca, paklauskite gydytojo, ar Jums reikia atlikti tyrimus dėl tuberkuliozės, įskaitant neaktyvią infekciją.
- Pasakykite gydytojui, jei neseniai artimai bendravote su TB sergančiu asmeniu.

## Vėžys ir odos vėžys

Jyseleca gali padidinti vėžio riziką. Pasakykite gydytojui, jei ant odos aptiksite bet kokį naują augantį darinį.

## Kraujo krešuliai kojų venose arba plaučiuose

- Nedelsdami praneškite gydytojui, jei pasireikštų kraujo krešulių kojose ar plaučiuose simptomai, pvz., skausmingas kojos patinimas, krūtinės skausmas ar dusulys.

## Cholesterolis

Didelis cholesterolio kiekis yra svarbus širdies ligų rizikos veiksnys. Kol vartosite Jyseleca, gydytojas stebės Jūsų cholesterolio kiekį kraujyje. Tai padės nuspręsti, ar Jums reikalingas gydymas cholesterolio kiekiui sumažinti.

## Vakcinos

- Vartojant Jyseleca, negalima skiepytis tam tikromis (gyvomis) vakcinomis (pvz., Zostavax™, vartojama juostinės pūslelinės (*Herpes zoster*) profilaktikai).
- Dėl vakcinų pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Jyseleca. Jie gali norėti įsitikinti, kad esate paskiepytas visomis numatytomis vakcinomis.

## Nėštumas, kontracepcija ir žindymas

Jyseleca draudžiama vartoti nėštumo metu.

- Naudokite veiksmingą patikimą kontracepciją, kol vartojate Jyseleca ir mažiausiai 1 savaitę po paskutinės dozės suvartojimo.
- Jei vartodama Jyseleca pastojote arba manote, kad galite būti nėščia, nutraukite Jyseleca vartojimą ir nedelsdami pasakykite gydytojui.
- Jei planuojate pastoti, iš anksto pasitarkite su gydytoju.

Nežindykite, kol vartojate Jyseleca.

## Širdies liga

Jyseleca gali padidinti tam tikrų širdies ligų riziką. Pasakykite gydytojui, jei jaučiate diskomfortą krūtinėje (kuris gali plisti į rankas, žandikaulį, kaklą ir nugarą), dusulį ar svaigulį.