Votre nom :

.....

.....

Nom du médecin
(qui a prescrit JYSELECA®) :

.....

.....

Numéro de téléphone du médecin :

.....

.....

Date à laquelle vous avez commencé JYSELECA® :

.....

.....

Gardez cette carte avec vous en permanence pendant que vous prenez JYSELECA® et montrez la à tous les professionnels de santé impliqués dans votre prise en charge ou votre traitement, par exemple un pharmacien ou un médecin urgentiste.

Visitez notre site web

RMA, version 10/2025

JYSELECA® (filgotinib)

Carte d'alerte Patient

Gardez cette carte avec vous en permanence.

Cette carte contient des informations importantes pour les patients concernant la sécurité de JYSELECA®. Veuillez lire la notice d'information du patient pour plus d'informations.

Infections

- JYSELECA® peut aggraver une infection existante ou augmenter la probabilité de contracter une nouvelle infection. Informez immédiatement votre médecin si vous tombez malade ou si vous présentez des signes d'infection tels que :
  - Mictions plus fréquentes que d'habitude, douleur ou gêne lors de la miction ou douleur au dos - ceux-ci peuvent être des signes d'une infection des voies urinaires
  - Fièvre ou frissons, essoufflement, toux, sensation inhabituelle de fatigue - ceux-ci peuvent être des signes de pneumonie
  - Fièvre, sueurs, perte de poids ou une toux persistante - ceux-ci peuvent être des signes de tuberculose (TB)
  - Une éruption cutanée douloureuse accompagnée de cloques; celle-ci peut être un signe de zona (herpès zoster)
- Avant de commencer à prendre JYSELECA®, demandez à votre médecin si vous devriez être testé(e) pour la TB, y compris pour une infection inactive
- Informez votre médecin si vous avez récemment été en contact étroit avec une personne atteinte de TB

Caillots sanguins dans les veines des jambes ou dans les poumons

- Informez votre médecin immédiatement si vous présentez des symptômes de caillots sanguins dans les veines des jambes ou dans les poumons, comme une jambe gonflée douloureuse, une douleur dans la poitrine ou un essoufflement

Cholestérol

- Un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque important de maladie cardiaque. Pendant que vous prenez JYSELECA®, votre médecin vérifiera votre taux de cholestérol. Cela aidera à décider si vous avez besoin d'un traitement pour abaisser votre taux de cholestérol

Vaccins

- Vous ne devriez pas recevoir certains vaccins (vaccins vivants, par exemple le vaccin qui est utilisé pour la prévention du zona) pendant que vous prenez JYSELECA®
- Avant de commencer à prendre JYSELECA®, discutez de vos vaccins avec votre médecin ou pharmacien. Ils voudront probablement s'assurer que vous êtes à jour de vos vaccinations

Grossesse, contraception et allaitement

JYSELECA® ne doit pas être pris pendant la grossesse

- Utilisez un moyen de contraception efficace pendant que vous prenez JYSELECA® et pendant au moins 1 semaine après la dernière prise
- Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant que vous prenez JYSELECA®, ou si vous pensez être enceinte, arrêtez de prendre JYSELECA® et parlez-en immédiatement à votre médecin
- Si vous prévoyez d'être enceinte, parlez-en au préalable à votre médecin

N'allaitez pas pendant que vous prenez JYSELECA®

Cancer et Cancer de la peau

- JYSELECA® peut augmenter le risque de cancer. Informez votre médicin si vous découvrez de nouvelles lésions cutanées.

Maladies cardiaques

- JYSELECA® peut augmenter le risque de certaines maladies cardiaques. Informez votre médicin si vous présentez des douleurs de poitrine (qui peuvent diffuser dans les bras, les machoires, le cou et le dos), un essoufflement et des vertiges.