

Ditt navn:

Legens navn (som foreskrev Jyseleca):

Legens telefonnummer:

Datoen du startet med Jyseleca:

Ha alltid med deg dette kortet mens du tar Jyseleca, og vis det til helsepersonell som behandler deg, for eksempel på apotek eller legevakt.

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til Legemiddelverket: www.legemiddelverket.no/pasient-melding eller se pasientvedlegget for mer informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Besøk vår hjemmeside:

www.jyseleca.eu

Jyseleca-PAC-v.4.0-08-2024
NO--JY-202411-00002



Sikkerhetsinformasjon



Etter krav fra
Statens legemiddelverk

Pasientkort

Ha alltid dette kortet med deg

Sikkerhetsinformasjon om ▼JYSELECA®
(filgotinib) for pasienter.

Dette kortet inneholder viktig informasjon for pasienter om sikkerheten av Jyseleca. Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmateriell på
www.felleskatalogen.no

ALFASIGMA 

Infeksjoner

- Jyseleca kan forverre en eksisterende infeksjon eller øke sjansen for at du får en ny infeksjon. Snakk med legen umiddelbart dersom du blir syk eller merker tegn på infeksjon, slik som:
 - feber eller frysninger, kortpustethet, hoste, unormal tretthet – dette kan være tegn på lungebetennelse.
 - feber, svetting, vekttap eller hoste som ikke forsvinner – dette kan være tegn på tuberkulose.
 - et smertefullt hudutslett med blemmer – dette kan være tegn på helvetesild (herpes zoster).
- Før du begynner med Jyseleca, må du spørre legen om du bør testes for tuberkulose, inkludert inaktiv infeksjon.
- Snakk med legen hvis du nylig har vært i nær kontakt med en person med tuberkulose.

Blodpropp i venene i beina eller lungene

- Snakk med legen øyeblikkelig hvis du får symptomer på blodpropp i beina eller lungene, for eksempel et smertefullt og hovent bein, brystmerter eller kortpustethet.

Kolesterol

Høyt kolesterol er en viktig risikofaktor for hjertesykdom. Mens du tar Jyseleca vil legen sjekke kolesterolnivået ditt. Dette er til god hjelp for å avgjøre om du trenger behandling for å redusere kolesterolnivået.

Vaksiner

- Du bør ikke ta visse (levende) vaksiner (for eksempel Zostavax™ som brukes til å forebygge helvetesild) mens du tar Jyseleca.
- Snakk med legen eller apoteket om vaksiner før du tar Jyseleca. De kan ønske å forsikre seg om at du har tatt de vaksinene du skal.

Graviditet, prevensjon og amming

Jyseleca må ikke brukes under graviditet:

- Bruk sikker prevensjon mens du tar Jyseleca og i minst 1 uke etter den siste dosen.
- Hvis du blir gravid mens du tar Jyseleca eller tror du kan være gravid, må du slutte å ta Jyseleca og kontakte lege øyeblikkelig.
- Hvis du planlegger å bli gravid, må du snakke med legen først.

Du må ikke amme mens du tar Jyseleca.

Kreft og hudkreft

Jyseleca kan føre til økt risiko for kreft. Snakk med legen dersom du opplever nye utvekster i huden.

Hjertesykdom

Jyseleca kan føre til økt risiko for visse typer hjertesykdommer. Snakk med legen dersom du opplever ubehag i brystet (som kan spre seg til armer, kjeve, nakke og rygg), kortpustethet eller svimmelhet.