

Imię i nazwisko pacjenta:

Imię i nazwisko lekarza
(który przepisał lek Jyseleca):

Numer telefonu lekarza:

Data rozpoczęcia stosowania leku
Jyseleca:

Podczas stosowania leku Jyseleca należy zawsze mieć tę kartę przy sobie w celu okazania personelowi medycznemu zajmującemu się Pana/Pani opieką medyczną lub leczeniem (np. farmaceucie, personelowi oddziału ratunkowego).



Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej

Sobi jest znakiem towarowym firmy Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).
© 2024 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jyseleca® jest znakiem towarowym firmy Alfasigma S.p.A.
© 2024 Alfasigma. Wszystkie prawa zastrzeżone.
NP-44333. Data przygotowania: lipiec 2025



Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta

Należy mieć tę kartę zawsze przy sobie.

Informacje dla pacjentów dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Jyseleca® (filgotynib).

 **Jyseleca**[®]
filgotinib

Niniejsza karta zawiera ważne informacje dla pacjentów dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Jyseleca. Dokładniejsze informacje podane są w Ulotce informacyjnej dla pacjenta.

 **sobi**

Zakażenia

- Lek Jyseleca może przyczynić się do pogorszenia już istniejącego zakażenia lub zwiększyć ryzyko wystąpienia nowego zakażenia. W razie zachorowania lub zauważenia poniższych objawów zakażenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza:
 - gorączka lub dreszcze, duszność, kaszel, uczucie większego niż zwykle zmęczenia – mogą to być objawy zapalenia płuc;
 - gorączka, pocenie się, utrata wagi lub utrzymujący się kaszel – mogą to być objawy gruźlicy;
 - bolesna wysypka skórna z pęcherzami – może być to objaw półpaśca (*herpes zoster*);
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Jyseleca pacjent powinien zapytać lekarza, czy należy poddać się badaniu w kierunku gruźlicy, w tym nieaktywnego zakażenia. Jeśli pacjent miał niedawno bliski kontakt z osobą chorą na gruźlicę, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Nowotwór i rak skóry

Lek Jyseleca może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu. Należy poinformować lekarza o każdej zauważonej nowej narośli na skórze.

Zakrzepica żył w kończynach dolnych lub zator płucny

- Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku pojawienia się bólu i obrzęku nogi, bólu w klatce piersiowej lub duszności, ponieważ mogą to być objawy zakrzepów żylnych w nogach lub zatoru w płucach.

Cholesterol

Duże stężenie cholesterolu jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby serca. W czasie stosowania leku Jyseleca, lekarz będzie monitorować stężenie cholesterolu we krwi pacjenta w celu ustalenia, czy konieczne jest leczenie zmniejszające stężenie cholesterolu.

Szczepionki

- Podczas stosowania leku Jyseleca nie należy przyjmować określonych (żywych) szczepionek (np. ZostavaxTM - szczepionka przeciw półpaścowi).
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Jyseleca należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą na temat przyjmowania szczepionek. Lekarz lub farmaceuta może chcieć upewnić się, że pacjent ma wykonane aktualne szczepienia.

Ciąża, antykoncepcja i karmienie piersią

Leku Jyseleca nie wolno stosować w okresie ciąży.

- Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas przyjmowania leku Jyseleca oraz przez co najmniej 1 tydzień po przyjęciu ostatniej dawki.
- Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Jyseleca lub przypuszcza, że może być w ciąży, powinna przerwać przyjmowanie leku Jyseleca i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
- Pacjentka przyjmująca lek Jyseleca powinna poradzić się lekarza, jeśli planuje zajście w ciążę.

Podczas przyjmowania leku Jyseleca nie karmić piersią.

Choroby serca

Jyseleca może zwiększać ryzyko wystąpienia pewnych chorób serca. Pacjent powinien powiadomić lekarza o uczuciu dyskomfortu w klatce piersiowej (który może promieniować do ramion, szczęki, szyi i pleców), duszności lub zawrotach głowy.